

Situl Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului Inferior, este situat pe teritoriul administrativ a trei județe: Arad, Hunedoara și Timiș; cuprinzând suprafețe aparținând la 10 localități: Bata, Bârzava, Birchiș, Petriș, Săvârșin, Vărădia de Mureș în județul Arad, Burjuc, Gurasada și Zam în Hunedoara și Margina în Timiș.

Suprafața sitului este de 32003ha și cuprinde valea Mureșului, și suprafețe de pe versanții ce mărginesc cursul râului, în special pe malul drept al acestuia.

Situl este suprapus parțial cu situl Natura 2000 ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior și se învecinează cu situl Natura 2000 ROSCI 0070 Drocea și Rezervația Naturală Runcu Groși.

Nu există date statistice cu privire la categoriile de proprietate și categoriile de folosință ale ariei. Putem spune că suprafața este acoperită în procent de 54% cu terenuri naturale (păduri, ape, mlaștini), 2% cu localități și 44% cu terenuri agricole, livezi și viță-de-vie.

Terenurile sunt în proprietatea statului cât și în proprietate privată și proprietatea primăriei.

Culoarul Mureșului, situat în partea de Sud a județului Arad, constituie o linie netă între Munții Poiana Ruscă și Dealurile Lipovei la Sud și Munții Zărandului la Nord. Ca unitate distinctă se conturează între Deva și Lipova, unde pe o distanță de circa 70 km Mureșul formează un culoar cu sectoare de bazine și văi înguste ceea ce atestă o morfologie extrem de complexă.

Datorită caracterelor pe care le prezintă culoarul Mureșului mai este cunoscut și sub denumirea de Defileul Mureșului Inferior.

Mureșul constituie principala arteră care drenează județul Arad pe o lungime de cca. 250 km, înregistrând pe acest parcurs o denivelare de 78 m și un bazin hidrografic de cca 4800 km².

Formațiunile geologice ale zonei cercetate, aparținând mezozoicului și neozoicului, sunt constituite din elementele înșirate mai jos

- a) Calcare neojurasice masive de tip stramberg și calcare micritice, în bază cu calcare alb - roșcate oxfordiene, așezate pe ofiolite. În calcarul masiv se deosebește o sedimentație calcaroasă de tip "haut fond" și o sedimentare de tip "shelf" (jurasicul terminal).
- b) Roci ofiolitice, care au luat naștere din magma primară tholeitică formată în pătura bazaltică a Pământului, în urma magmatismului ofiolitic alpin (jurasic - cretacic inferior), manifestat submarin în lungul unor falii profunde. A rezultat un complex bazaltic gros de aproximativ 3000 m, care cuprinde în plus variolite, anamesite și uneori piroclastite. În urma acestei prime etape a magmatismului ofiolitic alpin, a urmat o activitate vulcanică intermitentă (jurasic superior, neocomian).
- c) În continuare se află flișul calcaros rezultat prin denudarea calcarelor de tip Stramberg pe marginea bazinului de sedimentare și flișuri grezoase, cu gresii cuarțoase în ciment calcaros, conglomerate și marne.
- d) Corpul intruziv banatic, de la Săvârșin (cretacic superior, paleogen), format pe linia de fracturi de-terminată de mișcările laramice, constituit din două părți:
 - partea de nord (Temeșești), constituită din diorite cuarțifere granodiorite și filoane de aplite și cuarț cu molibdenit.
 - partea de sud, constituită din granite, cu filoane de aplite și porfire granitice, care străbat de fapt și partea de nord.

La punctele de contact, banatitele au metamorfizat rocile ofiolitice, transformând rocile bazaltice în corneene bazice.

e) Cuvertura sedimentară de vârstă holocenă în lunca Mureșului și lunca pârâului Troaș.

Datorită factorilor climatici și structurii geomorfologice, procesele pedogenetice evoluează în

Generalitati

Scris de Webmaster

Miercuri, 04 August 2010 23:04 - Ultima actualizare Miercuri, 27 Octombrie 2010 18:51

sensul heterogenizării tipurilor gene-tice de sol. În urma generalizării se pot determina următoarele tipuri genetice fundamentale:

a) Sol brun de pădure cu subtipurile: tipic 47%, pod-zolit 19%, pseudogleizat 14% și acid 8%. Solurile brune ocupă suprafața cea mai mare în zona cercetată. Sunt soluri cu troficitate ridicată, reavăn - jilave, slab acide, mijlociu profunde până la profunde, fără schelet sau slab scheletice.

Subtipul acid, întâlnit în nord - vestul bazinului. Valorile pH - ului variază între, 4,5 - 5,0.

b) Sol argiloiluvial brun - roșcat (12%), care se întâlnește la altitudini mici. Valorile pH - ului variază între 5 și 6.

c) Soluri aluvionare, de-a lungul pârâului Troașului și de-a lungul albiei Mureșului.

Tipuri de ecosisteme și habitate importante prezente în sit:

Singurul tip de habitat de importanță comunitară identificat până acum pe teritoriul sitului este ce de Păduri balcano-panonice de cer și gorun – 91M0. Habitatul acopera cca. 20% din suprafața sitului.

Clase de ecosisteme și habitate prezente în sit:

N06 Râuri, lacuri, N07 Mlaștini, turbării, N12 Culturi (teren arabil), N14 Pășuni, N15 Alte terenuri arabile, N15 Alte terenuri arabile, N16 Păduri de foioase, N21 Vii și livezi, N23 Alte terenuri artificiale (localități, mine), N26 Habitate de păduri (păduri în tranziție).

Specii de importanță comunitară vizate la înființarea sitului.

Specii din Anexa II a Directivei Habitate a CEE:

Mamifere: 1303 *Rhinolophus hipposideros*, 1304 *Rhinolophus ferrumequinum*, 1305 *Rhinolophus euryale*, 1306 *Rhinolophus blasii*, 1310 *Miniopterus schreibersi*, 1324 *Myotis myotis*, 1335 *Spermophilus citellus*.

Amfibieni și reptile: 1166 *Triturus cristatus*, 1188 *Bombina bombina*, 1193 *Bombina variegata*, 1220 *Emys orbicularis*.

Pești: 2511 *Gobio kessleri*, 2522 *Pelecus cultratus*, 1124 *Gobio albipinnatus*, 1130 *Aspius aspius*, 1134 *Rhodeus sericeus amarus*, 1138 *Barbus meridionalis*, 1146 *Sabanejewia aurata*, 1159 *Zingel zingel*, 1160 *Zingel streber*.

Alte specii importante la nivel național și internațional: *Alburnoides bipunctatus*, *Bufo bufo*, *Bufo viridis*, *Hyla arborea*, *Pelobates fuscus*, *Rana dalmatina*, *Rana temporaria*, *Salamandra salamandra*, *Triturus alpestris*, *Triturus vulgaris*, *Anguis fragilis*, *Coronella austriaca*, *Elaphe longissima*, *Lacerta agilis*, *Lacerta viridis*, *Natrix tessellate*, *Podarcis muralis*, *Vipera ammodytes*, *Vipera berus*, *Castor fiber*, *Lynx lynx*, *Canis lupus*, *Lutra lutra*, *Ophiogomphus cecilia*, *Pilemia tigrina*.

Specii din Anexa I a Directivei Păsări a CEE:

A229 *Alcedo atthis*, A089 *Aquila pomarina*, A215 *Bubo bubo*, A224 *Caprimulgus europaeus*, A031 *Ciconia ciconia*, A081 *Circus aeruginosus*, A122 *Crex crex*, A197 *Chlidonias niger*, A239 *Dendrocopos leucotos*, A238 *Dendrocopos medius*, A429 *Dendrocopos syriacus*, A236 *Dryocopus martius*, A026 *Egretta garzetta*, A027 *Egretta alba*, A098 *Falco columbarius*, A321 *Ficedula albicollis*, A320 *Ficedula parva*, A022 *Ixobrychus minutus*, A338 *Lanius collurio*, A339 *Lanius minor*, A023 *Nycticorax nycticorax*, A072 *Pernis apivorus*, A234 *Picus canus*, A151 *Philomachus pugnax*, A307 *Sylvia nisoria*, A166 *Tringa glareola*.